

Firazyr 30 mg, soluzione iniettabile in siringa pre-riempita

Icatibant

Legga attentamente questo foglio illustrativo prima di usare questo medicinale.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto per lei personalmente. Non lo dia mai ad altri. Infatti, per altri individui questo medicinale potrebbe essere pericoloso, anche se i loro sintomi sono uguali ai suoi.
- Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio, informi il medico o il farmacista.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Firazyr e a che cosa serve
2. Prima di usare Firazyr
3. Come usare Firazyr
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Firazyr
6. Altre informazioni

firazyr 30 mg

Soluzione iniettabile in siringa pre-riempita

Icatibant

1 CHE COS'È FIRAZYR E A CHE COSA SERVE

Firazyr è utilizzato per il trattamento dei sintomi dell'angioedema ereditario (AEE) in pazienti adulti. Nell'AEE i livelli nel sangue di una sostanza detta bradichinina aumentano e ciò è causa di sintomi quali gonfiore, dolore, nausea e diarrea.

Firazyr blocca l'attività della bradichinina e quindi arresta la progressione dei sintomi di un attacco di AEE.

2 PRIMA DI USARE FIRAZYR

Non usi Firazyr

- Se è allergico (ipersensibile) a icatibant o a uno qualsiasi degli eccipienti di Firazyr.

Faccia particolare attenzione con Firazyr

- Nel caso in cui alcuni degli effetti indesiderati associati a Firazyr siano simili ai sintomi della malattia di cui Lei è affetto. Comunichi immediatamente al medico curante se riscontra che i sintomi dell'attacco peggiorano dopo la somministrazione di Firazyr.
- Se soffre di angina (riduzione del flusso sanguigno al muscolo cardiaco), consulti il medico prima di assumere Firazyr.
- Se ha avuto un ictus di recente, si rivolga al medico prima di assumere Firazyr.

Uso di Firazyr con altri medicinali

Per Firazyr non sono note interazioni con altri medicinali; tuttavia, informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, compresi quelli senza prescrizione medica. Se sta assumendo un medicinale noto come inibitore dell'enzima di conversione

dell'angiotensina (ACE inibitore) (per esempio, captopril, enalapril, ramipril, quinapril, lisinopril), che è utilizzato per abbassare la pressione sanguigna o per altri motivi, informi il medico prima di assumere Firazyr.

Uso di Firazyr con cibi e bevande:

Cibi e bevande non hanno effetti sull'azione di Firazyr.

Gravidanza e allattamento

Se è in gravidanza o sta programmando una gravidanza, chiedi consiglio al medico prima di iniziare ad assumere Firazyr. Se sta allattando, non deve allattare per le 12 ore successive alla somministrazione di Firazyr.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non utilizzi macchinari se avverte un senso di stanchezza o capogiro dopo un attacco di AEE o dopo la somministrazione di Firazyr.

Informazioni importanti su alcuni eccipienti di Firazyr:

La soluzione per iniezione contiene meno di 1 mmol (23 milligrammi) di sodio, per cui, a fini pratici, si può considerare iposodica (priva di sodio).

3 COME USARE FIRAZYR

La somministrazione di Firazyr deve essere sempre eseguita dal medico o da un'infermiera. Il medico consiglierà quando è possibile fare ritorno a casa.

Quando e con quale frequenza assumere Firazyr?

Il medico ha stabilito la dose esatta di Firazyr e ne indicherà la frequenza di utilizzo. La dose raccomandata di Firazyr è una iniezione (3 ml, 30 mg) somministrata per via sottocutanea (sotto la pelle) non appena avverte che l'attacco di angioedema ereditario si sta aggravando (per esempio, aumento