

MEDICO REPERIBILE

+39 333 4004422

A questo numero risponde,
24 ore su 24, un medico del
centro di Milano

CONSIGLIO N1

Raccomandiamo a tutti i pazienti, in caso di attacco acuto addominale ed alla glottide di recarsi tempestivamente presso un presidio di pronto soccorso o di attivare la guardia medica senza aspettare che l'attacco raggiunga la sua massima manifestazione.

CONSIGLIO N3

Invitate gli operatori sanitari a consultare questo sito ed in modo particolare questa pagina.

CONSIGLIO N2

Fatevi accompagnare da un parente o da chiunque sia a conoscenza della vostra condizione di portatore di malattia rara in modo che possa assistervi e colloquiare con gli operatori sanitari nell'eventualità non foste in grado di essere completamente autosufficienti.

CONSIGLIO N4

Raccomandiamo a tutti i pazienti di portare direttamente con se il concentrato plasmatico C1 Berinert-P oppure il Firazir (icatibant/acetato) a seconda delle indicazioni ricevute dal vostro medico specialista. Inoltre non rimanete mai sprovvisti dei farmaci, avviando in modo tempestivo le varie pratiche soprattutto in vista di un'eventuale scadenza dei prodotti in possesso.

CONSIGLIO N5

Per qualsiasi necessità invitate il personale sanitario a contattare il numero di emergenza.

INDICAZIONI PER OPERATORI SANITARI

L'angioedema da carenza di C1-inibitore (C1-INH) è una malattia dovuta alla carenza, nel siero degli affetti, dell'inibitore della prima frazione del sistema del complemento. Può essere provocata da un difetto genetico (Angioedema ereditario) oppure da un aumentato consumo (Angioedema acquisito).